



Pour traiter votre diabète et améliorer vos glycémies, votre médecin vient de vous prescrire un médicament de la famille **des INHIBITEURS SGLT2**  
le .....  
À la posologie de ..... comprimé(s), ..... fois par jour

### Comment agit votre médicament ?

Il conduit à une élimination d'une partie plus importante du glucose dans les urines.

### Quand prendre votre médicament ?

Il doit être pris chaque jour au même moment, peu importe celui que vous choisirez.  
Si vous oubliez de le prendre, ne doublez pas la dose à la prise suivante.

### Quel délai entre le début du traitement et l'effet sur vos glycémies ?

Les glycémies peuvent s'améliorer dès les premiers jours de traitement.  
Le traitement sera revu et pourra être adapté en fonction de vos résultats : carnet de surveillance glycémique et hémoglobine glyquée = HbA1c (reflet glycémique global des 3 derniers mois).

### Quels sont les principaux effets indésirables possibles ?

Concernant les effets secondaires possibles de ce médicament, reportez-vous à la notice, et si besoin, parlez-en à votre médecin.

Dans la pratique, il est le plus souvent rapporté :

- Une augmentation du risque d'infections urinaires ou génitales,
- Plus fréquemment chez la femme, surtout si elle présente régulièrement ce type d'infections.

*Utilisé seul ce médicament est à faible risque d'hypoglycémie*

### Quelques précautions à prendre :

- Avoir une bonne hygiène.
- Bien boire de l'eau (peu importe si le volume des urines augmente).
- Aux premiers symptômes d'infection urinaire ou génitale, voir rapidement son médecin.

Avant de prendre un autre médicament de vous-même, demandez conseil à votre médecin ou votre pharmacien.  
Vous devez toujours signaler votre diabète et votre traitement à tous les professionnels de santé.

### \*\*\* A retenir \*\*\*

- Je prends mon traitement tous les jours au moment choisi.
- Je bois suffisamment d'eau.
- Si j'ai un signe d'infection urinaire, je contacte mon médecin.